




YSMYGU YMHLITH OEDOLION YNG NGHYMRU

Ysmygu yw achos sengl mwyaf afiechyd a marwolaeth cynnar ataliadwy yng Nghymru. Mae gan ysmygwyr mwy o risg o datblygu nifer o glefydau, gan gynnwys canser yr ysgyfaint, clefyd y galon a chlefydau rhwystrol cronig yr ysgyfaint (megis bronchitis). Credir bod ysmegu yn y Deyrnas Unedig yn gyfrifol am 8 o bob 10 marwolaeth o ganser yr ysgyfaint, 3 o bob 4 marwolaeth o glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint ac 1 o bob 5 marwolaeth oherwydd clefyd y galon¹. Mae mathau eraill o ganser sy'n gysylltiedig ag ysmegu'n cynnwys rhai'r geg, y gwddf, y bledren, y pancreas, y stumog a cheg y groth². Bydd tua hanner o'r holl bobl sy'n ysmegu'n marw o glefydau a achosir gan ysmegu ac mae eu risg o farw cyn cyrraedd 65 oed ddwywaith risg pobl nad ydynt yn ysmegu³. Mae tystiolaeth hefyd bod ysmegu'n niweidio iechyd pobl nad ydynt yn ysmegu.

- ✓ Mae oddeutu 600,000 neu 24% o'r oedolion yng Nghymru'n ysmegu.⁴

Mae cyfraddau ysmegu yng Nghymru heb newid rhwng 2007 a 2008, ar ôl gostwng o'u brig yn 2004/2005⁵



¹ Grŵp Ymgynghori ar Dybaco Coleg Brenhinol y Ffisigwyr (2000). *Nicotine addiction in Britain*. Llundain: Coleg Brenhinol y Ffisigwyr.

² International Agency for Research on Cancer (2002) *Tobacco smoke and involuntary smoking*. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Vol 83. Lyon: IARC

³ Ysmygu yng Nghymru: y ffeithiau 2007

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/568/WCH%20smoking%20ban%20report%20W%20final.pdf>


⁴ Arolwg Iechyd Cymru 2008. Ystadegau Cymru. Gwelwyd ar:

<http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/health2009/hdw200905211/?skip=1&lang=cy>

⁵ Arolwg Iechyd Cymru 2008. Ystadegau Cymru. Gwelwyd ar:



Cyfraddau ysmegu yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol yn 2008⁶



- ✓ Mae dynion ychydig yn fwy tebygol o ysmegu na menywod; roedd canran y boblogaeth sy'n ysmegu'n gostwng gydag oedran⁷.
- ✓ Mae oedolion mewn cartrefi sy'n cael eu rhedeg gan rywun yn y grŵp galwedigaeth lled-gyffredinol / cyffredinol neu rywun nad yw erioed wedi gweithio / sy'n ddi-waith yn yr hirdymor yn fwy tebygol o ysmegu na'r rhai mewn grwpiau economaidd-gymdeithasol eraill⁸.

<http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/health2009/hdw200905211/?skip=1&lang=cy>

⁶ Arolwg Iechyd Cymru 2008. Ystadegau Cymru. Gwelwyd ar:

<http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/health2009/hdw200905211/?skip=1&lang=cy>

⁷ Ysmegu yng Nghymru: y ffeithiau 2007

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/568/WCH%20smoking%20ban%20report%20W%20final.pdf>

⁸ Ysmegu yng Nghymru: y ffeithiau 2007



FFEITHIAU AC YSTADEGAU

tel: 029 2064 1101



- ✓ Mae oedolion mewn ardaloedd o fwy o amddifadedd (fel y diffinnir gan Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru) yn fwy tebygol o ysmegu na'r rhai mewn ardaloedd o lai o amddifadedd⁹.
- ✓ Mae'r ffactorau sy'n gysylltiedig ag ysmegu yn cynnwys oedran, grŵp economaidd-gymdeithasol, amddifadedd ardal, deiliadaeth tai ac addysg¹⁰.
- ✓ Amcangyfrifir bod 6,000 o bobl yn marw yng Nghymru bob blwyddyn o achos ysmegu. Mae modd priodoli 24% o farwolaethau dynion a 12% o farwolaethau menywod i ysmegu¹¹. Roedd bron pob un ohonynt wedi dechrau ysmegu pan oeddent yn blant¹².
- ✓ Amcangyfrifir y bydd tua hanner yr ysmegwyr cyson yn marw o ganlyniad uniongyrchol i ysmegu¹³. Amcangyfrifir hefyd bod ysmegwyr yn marw tua 10 mlynedd ynghynt ar gyfartaledd na phobl nad ydynt yn ysmegu¹⁴.
- ✓ Mae defnyddio tybaco yn cyfrannu'n sylweddol at anghydraddoldebau iechyd ar draws Cymru, ac yn un o'r prif bethau sy'n eu sbarduno. Yn fwy nag unrhyw fater arall, defnyddio tybaco sy'n gyfrifol am y bwch yn y disgwyliad oes rhwng y bobl fwyaf breintiedig a'r bobl fwyaf difreintiedig yn ein cymdeithas¹⁵.
- ✓ 12% yw'r cyfraddau ysmegu ymhlith y grwpiau Rheolaethol Uwch a Phroffesiynol yng Nghymru, o'u cymharu â 48% ymhlith y grwpiau Erioed Wedi Gweithio a Di-waith yn yr Hirdymor¹⁶.
- ✓ Mae 34 miliwn o ddyddiau gwaith yn cael eu colli yng Nghymru a Lloegr bob blwyddyn o ganlyniad i glefydau sy'n gysylltiedig ag ysmegu¹⁷.
- ✓ Amcangyfrifir mai £386 miliwn yw cost trin clefydau sy'n gysylltiedig ag ysmegu i'r GIG yng Nghymru bob blwyddyn¹⁸.

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/568/WCH%20smoking%20ban%20report%20W%20final.pdf>

⁹ Ysmegu yng Nghymru: y ffeithiau 2007

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/568/WCH%20smoking%20ban%20report%20W%20final.pdf>

¹⁰ Ysmegu yng Nghymru: y ffeithiau 2007

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/568/WCH%20smoking%20ban%20report%20W%20final.pdf>

¹¹ Ysmegu yng Nghymru: y ffeithiau 2007

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/568/WCH%20smoking%20ban%20report%20W%20final.pdf>

¹² Goddard, E. General Household Survey 2006: Smoking and drinking among adults 2006. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, 2008.

¹³ Ysmegu yng Nghymru: y ffeithiau 2007

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/568/WCH%20smoking%20ban%20report%20W%20final.pdf>

¹⁴ Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years' observations on male British doctors. *BMJ* 2004; 328: 1519.

¹⁵ Ysmegu yng Nghymru: y ffeithiau 2007

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/568/WCH%20smoking%20ban%20report%20W%20final.pdf>

¹⁶ Ysmegu yng Nghymru: y ffeithiau 2007

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/568/WCH%20smoking%20ban%20report%20W%20final.pdf>

¹⁷ Parrott S, Godfrey C (2004). Economics of smoking cessation. *BMJ* v 328, 947-949.

¹⁸ Phillips, C. a Bloodworth, A. (2009). The cost of smoking to the NHS in Wales. ASH Cymru a Sefydliad Prydeinig y Galon.



Mamolaeth ac ysmegu

Gall dod i gysylltiad yn ystod beichiogrwydd ac ym more oes arwain at fwy o debygrwydd o bwysau geni isel, marwolaeth yn y crud a chanser yr ysgyfaint yn ddiweddarach mewn bywyd¹⁹.

- ✓ Mae 37% o famau Cymru'n ysmegu ar ryw adeg yn ystod eu beichiogrwydd neu'r flwyddyn cyn hynny²⁰.
- ✓ Mae 22% o famau Cymru'n ysmegu drwy gydol eu beichiogrwydd²¹
- ✓ Mae mamau yng Nghymru'n fwy tebygol o ysmegu ac yn llai tebygol o roi'r gorau iddi nag yng ngwledydd eraill y Deyrnas Unedig²²
- ✓ Mae lefelau uwch o ysmegu cyn neu yn ystod beichiogrwydd ymysg mamau mewn galwedigaethau cyffredinol a gwaith llaw ac ymysg y rhai iau nag 20 oed. Roedd y mamau hyn hefyd yn llai tebygol o roi'r gorau iddi cyn neu yn ystod beichiogrwydd²³.
- ✓ Mae ysmegu gan y fam (ac o'r herwydd cysylltiad goddefol y ffetws) yn achosi hyd at tua 5,000 o erthyladau naturiol, 300 o farwolaethau amenedigol, a 2,200 o enedigaethau cynamserol babanod sengl yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn²⁴.
- ✓ Mae cysylltiad goddefol y ffetws i ysmegu gan y fam hefyd yn achosi i oddeutu 19,000 o fabanod gael eu geni â phwysau geni isel yn y Deyrnas Unedig bob blwyddyn²⁵.
- ✓ Mae'n bosibl bod ysmegu goddefol y fam yn lleihau ffrwythlondeb, yn cynyddu marwoldeb ffetysol ac amenedigol, ac yn cynyddu risg rhai annormaleddau cynhenid²⁶.
- ✓ Mae'n gwbl bosibl osgoi'r effeithiau andwyol hyn²⁷.

¹⁹ Smoking Kills - A White Paper on Tobacco (1998)

²⁰ Infant feeding survey 2005. Gwelwyd ar: <http://www.ic.nhs.uk/pubs/ifs2005>

²¹ Infant feeding survey 2005. Gwelwyd ar: <http://www.ic.nhs.uk/pubs/ifs2005>

²² Ysmegu yng Nghymru: y ffeithiau 2007

<http://www.wales.nhs.uk/sites3/Documents/568/WCH%20smoking%20ban%20report%20W%20final.pdf>

²³ Infant feeding survey 2005. Gwelwyd ar: <http://www.ic.nhs.uk/pubs/ifs2005>

²⁴ BMA. *Smoking and reproductive life: the impact of smoking on sexual, reproductive and child health*. Llundain .MA 2004.

²⁵ BMA. *Smoking and reproductive life: the impact of smoking on sexual, reproductive and child health*. Llundain .MA 2004.

²⁶ RCP 2010. Passive smoking and children. Gwelwyd ar <http://www.rcplondon.ac.uk/professional-Issues/Public-Health/Documents/Preface-to-passive-smoking-and-children-March-2010.pdf>

²⁷ RCP 2010. Passive smoking and children. Gwelwyd ar <http://www.rcplondon.ac.uk/professional-Issues/Public-Health/Documents/Preface-to-passive-smoking-and-children-March-2010.pdf>